

Le nuove diagnosi di infezione da HIV in Emilia-Romagna

I dati del Sistema di Sorveglianza regionale (2006-17)

Casi con nuova diagnosi di infezione da HIV per sesso Emilia-Romagna (2006-17)

		Anno di diagnosi												
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2006-17
Maschi	N. casi	256	275	310	303	278	271	270	225	271	234	200	193	3.086
	Incidenza*	12,6	13,4	14,9	14,4	13,0	12,6	12,5	10,4	12,6	10,8	9,3	8,9	12,1
Femmine	N. casi	112	112	116	115	110	91	103	75	68	57	85	69	1.113
	Incidenza*	5,2	5,2	5,3	5,2	4,9	4,0	4,5	3,3	3,0	2,5	3,7	3,0	4,1
Totale residenti	N. casi	368	387	426	418	388	362	373	300	339	291	285	262	4.199
	Incidenza*	8,8	9,2	10,0	9,6	8,8	8,2	8,4	6,7	7,6	6,5	6,4	5,9	8,0

*Incidenza= nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 abitanti

Le caratteristiche dell'infezione da HIV in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna nel 2017 sono state registrate **262 nuove diagnosi** di infezioni da HIV in persone residenti, con un'incidenza pari a 5,9 casi ogni 100.000 abitanti.

L'incidenza si mantiene più alta nel sesso maschile (8,9 rispetto al 3,0 del sesso femminile).


Nel periodo 2006-17 l'incidenza media è risultata pari a 8,0 casi per 100.000 abitanti, **con un trend complessivamente in calo** in entrambi i sessi, anche se più marcato in quello maschile. I valori più alti si sono registrati nelle province di Rimini e Parma, quelli più bassi in quelle di Ferrara, Piacenza e Modena.

Nell'intero periodo considerato **le persone sieropositive** diagnosticate sono prevalentemente di sesso maschile (74%), nella fascia di età 30-39 anni (32%) e di nazionalità italiana (69%).


La **modalità di trasmissione** principale risulta essere nell'87% dei casi quella **sessuale** (52% eterosessuale e 35% omo-bisessuale); in particolare nel 2017 la trasmissione eterosessuale risulta più alta rispetto a quella omo-bisessuale (rispettivamente 51% e 40%).

In quasi un quinto dei casi (19%) di sesso femminile, la sieropositività è stata scoperta in corso di gravidanza; in genere si tratta di donne straniere (83%).


Incidenza* delle nuove diagnosi di infezione da HIV per provincia di residenza in Emilia-Romagna (2006-17)




Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione in Emilia-Romagna (2006-17)




Una diagnosi precoce dell'infezione da HIV consente di attivare tempestivamente cure efficaci. Nel periodo 2006-17 poco più della metà (51%) delle persone sieropositive diagnosticate è invece giunta tardivamente alla diagnosi HIV, presentando AIDS conclamato e/o un numero di linfociti CD4 inferiore a 350 cellule/mm³ (**Late Presenters - LP**). Nel 2017 tale quota è pari al 57%. Questi dati sottolineano l'importanza di continuare gli interventi tesi a promuovere l'uso di test e aumentare la consapevolezza dei rischi.



Le **classi di età** più colpite sono quelle tra i 20 e 49 anni: il fenomeno è appena rilevabile per i giovanissimi sotto ai 20 anni e negli ultra cinquantenni.



Nel 2017 i **nuovi casi di AIDS** residenti in Emilia-Romagna sono stati 57. Il tasso di incidenza biennale 2016-17 (più stabile, vista la scarsa numerosità) è pari a 1,5 casi di AIDS per 100.000 abitanti.



Dal 1996, anno di introduzione delle terapie antiretrovirali (ARV), si è osservato un forte calo delle diagnosi e dei decessi, con un incremento progressivo del numero delle persone che vivono con una diagnosi di AIDS.

